

• Ingrepen

Inhoud

• Hysteroscopie/curretage	p. 2
• Ablatio	p. 3
• Laparoscopie	p. 3
• Hysterectomie	p. 3



• *Moment tijdens een operatie.*

Er zijn verschillende ingrepen mogelijk, de een ingrijpender dan de ander.

De meest voorkomende zijn:

- 1• Hysteroscopie/curretage.
- 2• Ablatio.
- 3• Laparoscopie.
- 4• Hysterectomie.

Hysteroscopie/ Curretage


Bij een hysteroscopie kijkt men met behulp van een toestel (een hysteroscoop) in de baarmoeder. **Op deze manier lokaliseert men de letsels beter om ze nadien eventueel te verwijderen.**

Een hysteroscopie gebeurt via vaginale weg en wordt meestal gevolgd door een curettage, tenzij men enkel een diagnose wil stellen.

Zo'n diagnostische hysteroscopie kan onder lokale verdoving, terwijl een hysteroscopie gevolgd door een curettage steeds onder algemene verdoving gebeurt.

Een curettage is het weghalen van de oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies. Daarna wordt het verwijderde weefsel steeds onderzocht op de dienst anatomopathologie.

Een hysteroscopie gebeurt meestal via dagopname: u dient zich nuchter op de afgesproken dag aan te melden op het dagziekenhuis.



• *Voorbeeld van een hysteroscopie.*

Ablatio


Bij een endometrium ablatio wordt het slijmvlies van de baarmoeder tot in de diepste laag weggenomen. Bij een curettage wordt enkel de oppervlakkige laag verwijderd.

Het is dus als het ware een ruimere curettage.

Het verwijderde weefsel wordt steeds onderzocht in het labo.

Een ablatio gebeurt eveneens via dagopname.

Laparoscopie



• *Voorbeeld van een laparoscopie.*

Een laparoscopie is een kijkoperatie waarbij men de organen van de buik onderzoekt. Deze ingreep gebeurt om een diagnose te stellen (diagnostische laparoscopie).

Maar men kan ook via een laparoscopie ingrepen verrichten (operatieve laparoscopie).

Een diagnostische laparoscopie vereist meestal een dagopname, voor een operatieve laparoscopie moet men, afhankelijk van de soort ingreep, 2 tot 3 dagen opname verwachten.

Hysterectomie

Een hysterectomie is een ingreep waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Een hysterectomie kan uitgevoerd worden via vaginale weg (vaginale hysterectomie), of de buik (abdominale hysterectomie). Bij een abdominale hysterectomie wordt net boven de schaamstreek een insnede in de buik gemaakt om zo bij de baarmoeder te komen. Indien nodig kunnen ook de eileiders en/of eierstokken verwijderd worden.

Wanneer enkel de baarmoeder wordt verwijderd, zullen de eierstokken normaal blijven functioneren, zodat er geen overgangsverschijnselen optreden. U zal ook geen menstruatie meer hebben.

Een opname voor een hysterectomie varieert gemiddeld tussen de 5 en 7 dagen afhankelijk of het gaat om een vaginale of abdominale hysterectomie.